

I Jornadas de Saúde Materno-Infantil da Margem Esquerda do
Guadiana – 18-19 Maio 2012

Desenvolvimento de competências parentais no puerpério através da Visita Domiciliária de Enfermagem

REVISÃO INTEGRATIVA



Margarida Sim-Sim
Maria da Luz Barros
Antónia Martins

Visita Domiciliar

CIPE “Cuidado Domiciliar”

- Cuidado holístico prestado ao cliente no seu próprio ambiente; para diversos ambientes de saúde; utilizando uma abordagem multidisciplinar que envolve o doente, a família e os prestadores de cuidados, transferindo aptidões para maximizar aquilo que as pessoas podem fazer por si próprias mas proporcionando aconselhamento, monitorização e apoio ao cliente e aos prestadores de cuidados

Período Puerperal

- Fase sensível
- Ambiente hormonal
- Regresso a casa
- Novos papeis
- Novos desempenhos

Conceito Clínico [Centeno, 2010]

- Puerpério Imediato: primeiras 24h
- Puerpério Precoce: até ao final da 1ª semana
- Puerpério Tardio: até ao final da 6ª semana

Competências Maternais

Conceito: componente do papel maternal que está contido no micro-sistema da mulher e se traduz na habilidades de cuidar a criança e de interpretar os seus sinais e respostas

Fatores Intrínsecos que influenciam:

- Paridade; Experiência anterior com crianças; estado mental; idade; auto-estima; auto-eficácia...

Fatores Extrínsecos que influenciam:

- Temperamento e respostas da criança...

Copeland & Harbaugh (2004)

Questão Orientadora

- Que competências maternas adquire ou desenvolve a mulher sujeita a Visita Domiciliária no Período Puerperal?

Revisão Integrativa

Objetivo

- Analisar a percepção de aquisição e desenvolvimento de competências maternas das puérperas utentes de visita domiciliária de enfermagem

Desenho

- Estudo retrospectivo secundário no formato de Revisão Integrativa

Tipos de Revisão de Literatura

- Revisão Narrativa
- Revisão Integrativa
- Revisão Sistemática
- Meta-análise
- Meta-síntese

Revisão Integrativa


- Recolha e análise de produção científica de variado espectro
- Permite a combinação de metodologias diferentes [experimental, não experimental, teórica...]
- Possui papel relevante na PBE em Enfermagem

Revisão Integrativa

- Protocolo de Pesquisa

	Crítérios de Inclusão
Participantes	Mulheres em fase puerperal
Intervenção	Ocorrência de Visita Domiciliária realizada por Enfermeiros
Comparações	Entre estudos que utilizam vários e/ou diferentes protocolos de Visita Domiciliária
Resultados	Percepção das mães sobre os efeitos da VD nos seus comportamentos maternos
Desenho	Estudos empíricos transversais e longitudinais, experimentais, quasi-experimentais ou não experimentais, quantitativos, realizados entre Janeiro de 2002 e Março de 2012, publicados em literatura branca, nos idiomas inglês, português, espanhol

Objetivos Milénio : até 2015



Objectivo 5
Melhorar
a saúde
materna

Objectivo 3
Promover
a igualdade
de género e o
empoderamento
das mulheres

Grelha de Análise do Artigo

Identificação do artigo	
Objetivos	
Questão de investigação	
Tipo de Estudo	
Tipo de Amostragem	
Tipo de Amostra	
Amostra	
Nível de Evidência	
Instrumentos aplicados	
Tratamento dos dados nas variáveis em observação	
Resultados	
Conclusões	
Recomendações dos autores	

Questão Orientadora

- Que competências maternas adquire ou desenvolve a mulher sujeita a Visita Domiciliária no Período Puerperal?



PubMed - MeSH

- **House Calls:** Visits to the patient's home by professional personnel for the purpose of diagnosis and/or treatment.
- **Postpartum Period:** In females, the period that is shortly after giving birth (PARTURITION).
- **Maternal Behavior:** The behavior patterns associated with or characteristic of a mother.
- **Postnatal Care:** The care provided to women and NEWBORNS for the first few months following birth.
- **Public Health Nursing:** The field of nursing focusing on the health of the community through educational and preventive programs, as well as providing treatment and diagnostic services
- **Community Health Nursing:** General and comprehensive nursing practice directed to individuals, families, or groups as it relates to and contributes to the health of a population. This is not an official program of a Public Health Department.

BVS - DeCS




Entre uma ou mais palavras Todos os índ

método: ☒ integrado ☐ por palavras ☐ google

[pesquisa via descritores DeCS/MeSH](#)

- Puerpério: Período Posparto compreende o período logo após se dar o nascimento (PARTO)
- Visita Domiciliar: Ida de médicos e outros profissionais de saúde às casas de moradores de uma determinada comunidade. Além de aproximá-lo desta comunidade, permite um atendimento mais particularizado, um conhecimento das condições de saúde e de vida, em termos econômicos, sociais e familiares.

Equação de Pesquisa nas BD

Base de Dados	Descritores – Palavras-Chave
	House Calls & [Postpartum Period OR Postnatal Care] & Maternal Behaviors & [Public Health Nurses OR Community Health Nursing]
	Período Posparto & Visita Domiciliar
	Academic Search Complete Home Visit OR Puerperal Visit & Postpartum OR Puerperium & Maternal Perception & Nursing Care
	Medline with full text Home Visit OR Puerperal Visit & Postpartum OR Puerperium & Maternal Perception & Nursing Care
	Eric Home visit & Postpartum

Encontrados 20 artigos; selecionados 12

Exemplo - PubMed

NCBI Resources ▾ How To ▾ My NCBI Sign In

PubMed.gov
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

PubMed ▾

Advanced

Search

Help

Display Settings: ▾ Abstract

Send to: ▾

Full Text
Online



Public Health Nurs. 2008 Mar-Apr;25(2):115-25.

Effect of postnatal home visits on maternal/infant outcomes in Syria: a randomized controlled trial.

Bashour HN, Kharouf MH, Abdulsalam AA, El Asmar K, Tabbaa MA, Cheikha SA.

Department of Family and Community Medicine, Faculty of Medicine, Damascus University, Damascus, Syria. hbashour@scs-net.org

Abstract

OBJECTIVE: Early postpartum home visiting is universal in many Western countries. Studies from developing countries on the effects of home visits are rare. In Syria, where the postpartum period is rather ignored, this study aimed to assess whether a community-based intervention of postnatal home visits has an effect on maternal postpartum morbidities; infant morbidity; uptake of postpartum care; use of contraceptive methods; and on selected neonatal health practices.

DESIGN: A randomized controlled trial was carried out in Damascus. Three groups of new mothers were randomly allocated to receive either 4 postnatal home visits (A), one visit (B), or no visit (C).

SAMPLE: A total of 876 women were allocated and followed up.

INTERVENTION: Registered midwives with special training made a one or a series of home visits providing information, educating, and supporting women.

RESULTS: A significantly higher proportion of mothers in Groups A and B reported exclusively breastfeeding their infants (28.5% and 30%, respectively) as compared with Group C (20%), who received no visits. There were no reported differences between groups in other outcomes.

CONCLUSIONS: While postpartum home visits significantly increased exclusive breastfeeding, other outcomes did not change. Further studies framed in a nonbiomedical context are needed. Other innovative approaches to improve postnatal care in Syria are needed.

PMID: 18294180 [PubMed - indexed for MEDLINE]

+ Publication Types, MeSH Terms, Grant Support

+ LinkOut - more resources

Save items

☆ Favorite ▾

Related citations in PubMed

A randomized comparison of home visits and hospital-based group follow-up. [Pediatrics. 2001]

Postnatal home visits in teenage mothers: a randomised controlled trial. [Lancet. 2003]

Home versus hospital breastfeeding support for newborns: a randomized controlled trial [Birth. 2002]

Review Postpartum home visits: extending the continuum of care for [Home Healthc Nurse. 1998]

Review Systematic review of the literature on postpartum care: effectiveness of post [Birth. 2006]

See reviews...

See all...

Cited by 1 PubMed Central article

Review Home visits by community health workers to prevent [Bull World Health Organ. 2010]

Grelha Resultados - Exemplo

BD	Pubmed
Identificação do artigo	Bashour, H., Kharouf, M., AbdulSalam, A., Asmar, K., Tabbaa, M. & Cheikha, S. (2008). Effect of postnatal home visits on maternal/infant outcomes in Syria: a randomized controlled trial. <i>Public Health Nursing</i> , 25(2) 115-125
Objetivos	Eficácia de intervenção comunitária de VD relativamente a morbilidade infantil e materna pós-parto, cuidados pós-parto, continuidade de AM aos 4 meses, vacinação da criança, uso de contraceção em mães com parto vaginal normal
Quest. investigação	Não formulada especificamente
Tipo de Estudo	Ensaio Clínico
Tipo de Amostra	Aleatória formando 3 grupos; aleatorização: 7 casos de 21 partos/dia [partos dia = 30 a 35] excluídos os não elegíveis
Amostra	876 mulheres com parto vaginal ou cesariana e RN saudável da maternidade do Teaching Hospital em Damasco, vivendo a 30Km, que estavam disponíveis para follow-up nos 6 meses seguintes e que deram consentimento; 19 enfermeiras realizaram as visitas
Nível de Evidência	1
Intervenção	VD com exame/observação da mulher, educação, apoio, aconselhamento em programa de intervenção ao 1º dia, 3º dia, 7º dia, 4ª semana, realizada por parteiras que frequentaram anteriormente curso preparatório específico de 5 dias com programa definido Grupo A 285 mulheres: 4 VD [1º, 3º, 7º e 30º dias] Grupo B 294 mulheres: 1 VD [3º dia] Grupo C 297 mulheres: padrão de cuidados local = Sem VD após a alta [grupo controlo]
Instrumentos aplicados	Avaliação aos 4 meses pós-parto através de técnicos sociais que administraram questionário [1] intercorrências de saúde materna pós-parto; 2) cuidados neo-natais; 3) contraceção; 4) doença da criança; 5) imunização até aos 3 meses; 6) tipo de alimentação da criança; 7) percepção das mulheres sobre a VD e sua qualidade
Tratamento dos dados nas variáveis em observação	Estatísticas Descritivas: sobre características socio-económicas, história obstétrica, ocorrência de cuidados pré-natais Estatística Inferencial: χ^2 e análise de variância ANOVA; Programa SPSS, versão 14; p-value .05
Resultados	1439 VD; 96 controle de qualidade por telefone Parteiras: relatório de exame físico, referências, detalhe de problemas de saúde identificados, conteúdos de educação para a saúde [20% abaixo do esperado; 42,8% satisfatórios; 37,2% muito bons] 3 grupos não diferiam na contraceção e auto-cuidado; Grupo A: + mulheres referiam que com a VD não necessitavam de outros cuidados de saúde; Grupo C: + mulheres referiam que não recorriam a Serv. Saúde ou outros tratamentos por serem dispendiosos Grupo A & B: maior % de aleitamento exclusivo [GA=28,5%, GB=30%, GC=20%; p=.023] Grupo C: AM a pedido maior [75%] comparado a GA [62.5%] e GB [67%] Grupo C: - problemas de sono nas crianças [16.8%] comparadas com GA [24%] e GB [26.4%] Primíparas: menor experiência na iniciação e continuidade do AM Cesariadas: menor iniciação e continuidade do AM [política hospitalar separa mãe-filho]
Conclusões	Mulheres valorizam VD; Papel das parteiras período pós-natal é importante; Necessidade de formação curricular em VD; materiais de informação para mãe são necessários [embora iliteracia possa prejudicar]; VD aumentou taxa de AM exclusivo
Recomendações dos autores	Estrutura não Bio-medica da VD é necessária, valorizando apoio social e emocional Internamentos curtos necessitam acompanhamento por VD

Temas Emergentes

- Melhoria no Aleitamento Materno
- Relacionamentos de conjugalidade equilibrados
- Satisfação com Parentalidade
- Desenvolvimento das crianças a longo prazo
- Enquadramento Cultural e Financeiro
- Morbilidade
- Controlo da gravidez subsequente
- VD como fonte de recurso



Recomendações

- Primeira Visita Domiciliar deve ocorrer na 1ª semana pós-alta hospitalar
 - Visita tardia decresce nos efeitos benéficos
- Políticas de Saúde que melhorem a acessibilidade de mulheres de baixa renda a VD
- Contacto telefónico perde potencial
- Apoio por visitadores voluntários não tem impacto na melhoria da DPP

Protocolo de VD?

Competências Maternais no Puerpério & VD de Enfermagem

